INDICACIÓN:

El anastrozol pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la aromatasa no esteroide. Actúa disminuyendo la cantidad de estrógeno que produce el cuerpo. Esto puede retardar o detener el crecimiento de varios tipos de células del cáncer de seno que necesitan estrógeno para crecer.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE **ALMACENAMIENTO**



Mantenga este medicamento envase original, en su cerrado herméticamente v fuera del alcance de los niños.

Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño ni en la cocina).

RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Anastrazol es un medicamento que se toma por vía oral una vez al día preferiblemente en horas de la noche (antes de acostarse).
- Tome el anastrozol aproximadamente a la misma hora todos los días con un vaso de agua.
- Si se olvida de tomar una dosis, no tome una dosis doble al día siguiente.
- No debe abandonar el medicamento sin consultar a su médico.

REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:







Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Medico tratante y Químico Farmacéutico.

Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.

Los efectos secundarios de la Anastrazol pueden controlarse.

Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección SPF 50 o superior y ropa protectora.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Mantenga una nutrición e hidratación adecuada.



Si experimenta sofocaciones, usar ropa liviana, mantener un ambiente fresco y colocarse paños fríos en la cabeza pueden reducir los síntomas.



Descanse mucho.

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas



PRECAUCIONES:

- Antes de comenzar el tratamiento con Anastrozol, asegúrese de informar a su médico acerca de los demás medicamentos que toma (incluso los medicamentos recetados, los medicamentos de venta sin receta médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas, etc.).
- embarazadas muieres quedan Las embarazadas durante el tratamiento deben ser informadas acerca del posible riesgo para el feto.
- Tanto para hombres como para mujeres: No intente embarazada) concebir (quedar durante tratamiento con Anastrozol.
- Se recomiendan los métodos de anticoncepción de barrera, como los condones. Consulte a su médico sobre cuándo podría quedar embarazada o concebir después del tratamiento, sin correr riesgos.
- O No amamante mientras esté en tratamiento con Anastrozol.







SEÑALES DE ALERTA

síntomas indican a que se continuación requieren atención médica, una emergencia. pero son Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Nauseas que afectan la alimentación.
- Fatiga (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal).

Es importante que mantenga una lista escrita de todas los medicamentos que está tomando, incluyendo las que recibió con formula médica y las que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas v suplementos de dieta.



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ANASTRAZOL



Servicio Farmacéutico

Programa de Atención Farmacéutica,

www.oncologosdeloccidente.com

Oncologos del Occidente S.A.S

No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE. resolución 2015018305 de 11-05-2015

Armenia Sede ppal, Av. Centenario Cra. 6 A N° 2-63 Hospital San Juan de Dios 4º piso

Pereira Clinica de Alta Tecnologia Maraya 3310712 Ext 468 Av. Circunvalar Nº 1-46

Manizales Sede San Marcel Calle 92 N° 29-75 Hospital Universitario Infantil Calle 48 N° 25-71 8933440-8742494

Cartago 2144646