

INDICACIÓN:

El Axitinib pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la cinasa. Actúa bloqueando la acción de una proteína anormal que estimula la multiplicación de células cancerosas. Esto ayuda a retardar o detener la propagación de dichas células.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad.



No guardar en el baño ni en la cocina.


RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Tomar el medicamento por vía oral con un vaso de agua.
- El medicamento a veces se toma dos veces por día, tenga en cuenta las recomendaciones de su médico.
- Consumir el medicamento antes o después de las comidas.
- Ingerir el medicamento a la misma hora todos los días.
- Si olvida tomar el medicamento, no tomar doble dosis al día siguiente.



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:


Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Axitinib pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia.



Evitar el contacto con el sol, utilice siempre protector solar con un factor de protección igual o superior a SPF 50, utilice ropa protectora.



Hay medicamentos que pueden interactuar con este tratamiento, informe que medicamentos está tomando y así evitar un fallo terapéutico en su tratamiento.



Evite quedar en embarazo o que su pareja quede en embarazo. Consulte con su médico el método anticonceptivo ideal para su tratamiento.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



No tome jugo de Pomelo o Toronja ni coma esta fruta Durante el consumo del Axitinib.

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

PRECAUCIONES:

- No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.
- Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebé.
- No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.
- No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consulta a su médico o farmacéutico. El hipérico o “hierba de San Juan” puede reducir la eficacia de este fármaco.
- Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo las que recibió con fórmula médica y las que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.



SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Episodios hemorrágicos.
- Dolor abdominal.
- Una pierna inflamada, roja, sensible o caliente al tacto y la otra no.
- Dolor de cabeza fuerte, convulsiones, confusión, ceguera o alteraciones de la vista, o problemas de razonamiento.



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

AXITINIB



www.oncologosdeloccidente.com

Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica,
Oncólogos del Occidente S.A.S

**No deje que ninguna otra persona
tome sus medicamentos.**

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del
Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución
2015018305 de 11-05-2015

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
CII 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646