

## INDICACIÓN:

La Bicalutamida pertenece a una clase de medicamentos llamados antiandrógenos no esteroides. Actúa bloqueando el efecto del andrógeno (una hormona masculina) para detener el crecimiento y la propagación de las células del cáncer.

### CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños.

Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño ni en la cocina).



### RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- La Bicalutamida viene en forma de tabletas que se toman por vía oral.
- Por lo general se toma una vez al día, por la mañana o por la noche, con o sin alimentos.
- Tome la Bicalutamida más o menos a la misma hora todos los días y solo con agua.
- Debe empezar a tomar la Bicalutamida el mismo día que le empiecen a inyectar la hormona liberadora de la hormona luteinizante.



## REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

**Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:**



**Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico.**

Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento. Los efectos secundarios de la Bicalutamida pueden controlarse. Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

## CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Beba diariamente suficiente líquido para mantener hidratado.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Mantenga una nutrición adecuada.



Si experimenta sofocaciones, usar ropa liviana, mantener un ambiente fresco y colocarse paños fríos en la cabeza pueden reducir los síntomas.



Descanse mucho.



No interrumpa el tratamiento con Bicalutamida, a menos que se lo indique su médico. Tome el medicamento exactamente como se le indicó.

**Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas**

## PRECAUCIONES:

- Antes de comenzar el tratamiento con Bicalutamida, asegúrese de informar a su médico acerca de los demás medicamentos que toma (incluso los medicamentos recetados, los medicamentos de venta sin receta médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas, etc.).
- Los pacientes diabéticos deben controlar de cerca la concentración de glucosa sérica.
- No interrumpa el tratamiento con Bicalutamida sin antes consultar a su proveedor de atención médica.
- Los antiandrógenos usualmente se administran a hombres. Sin embargo, si se administra Bicalutamida a una mujer, ésta debe evitar quedar embarazada ya que puede provocar daño fetal. Se debe evitar amamantar.

## SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Dolor de pecho.
- Dificultad para respirar.
- Retención de la orina o incapacidad de orinar (durante 8 a 12 horas).
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con los medicamentos recetados).
- Vómitos (4 ó 5 veces en un período de 24 horas).
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).

Es importante que mantenga una lista escrita de todas los medicamentos que está tomando, incluyendo las que recibió con fórmula médica y las que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.



**ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE**  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

**BICALUTAMIDA**



[www.oncologosdeloccidente.com](http://www.oncologosdeloccidente.com)

**Servicio Farmacéutico**  
**Programa de Atención Farmacéutica,**  
**Oncólogos del Occidente S.A.S**

**No deje que ninguna otra persona  
tome sus medicamentos.**

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del  
Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución  
2015018305 de 11-05-2015

Armenia  
Sede ppal. Av. Centenario  
Cra. 6 A N° 2-63  
7383100  
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira  
Clínica de Alta Tecnología Maraya  
Cll 50 N° 13-10  
3310712 Ext 468  
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales  
Sede San Marcel  
Calle 92 N° 29-75  
Hospital Universitario Infantil  
Calle 48 N° 25-71  
8933440-8742494

Cartago  
Cra 2 N° 23-12  
2144646