

INDICACION:

Bosutinib pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de quinasa. Actúa bloqueando la acción de una proteína anormal que envía señales a las células del cáncer para multiplicarse. Esto ayuda a detener la propagación de las células del cáncer.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad. No guardar en el Baño ni en la Cocina.



RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACION

- El bosutinib viene en cápsulas y se administra por vía oral. Debe tomarse con las comidas con un vaso con agua.
- Trague enteras las cápsulas de bosutinib. No las mastique, aplaste ni rompa.
- Tome el bosutinib según lo indicado. No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico.
- Si se salta una dosis, tómese tan pronto como se acuerde. Si estuviera muy cerca de su siguiente dosis (en un plazo de 12 horas), tómese sólo la dosis siguiente a su hora regular.



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, La mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Bosutinib pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia. Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección (SPF) 50 o superior y ropa protectora.



Puede estar en riesgo de infección, por lo que trate de evitar las multitudes y las personas resfriadas o que no se sientan bien, e informe a su proveedor de atención médica si tiene fiebre u observa otros signos de infección.



Beba diariamente suficiente cantidad de líquido, a menos que se le haya indicado limitar el consumo, Esto disminuirá sus probabilidades de sufrir estreñimiento y evitará la deshidratación.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Descanse mucho.



No tome jugo de Pomelo o Toronja ni coma esta fruta Durante el consumo del Bosutinib.



Mantenga una buena nutrición

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

PRECAUCIONES:

No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.

Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebé.

No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.

No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consulta a su médico o farmacéutico, El hipérico o "hierba de San Juan" puede reducir la eficacia de este fármaco.

Tanto para hombres como para mujeres: Evite la concepción mientras tome Bosutinib.

Es importante que mantenga una lista escrita de todas los medicamentos que está tomando, incluyendo las que recibió con fórmula médica y las que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.



SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Vómitos y Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Incapacidad de comer o beber durante 24 horas o signos de deshidratación: cansancio, sed, sequedad bucal, orina oscura y en menor cantidad o mareos
- Color amarillento de la piel o los ojos
- Orina de color oscuro o marrón (del color del té)
- Disminución del apetito
- Dolor en la parte derecha del estómago
- Sufre hemorragias o hematomas con mayor facilidad que de costumbre
- Infección de las vías respiratorias
- Cefalea, dolor de espalda o dolor en las articulaciones
- Alteraciones de la piel (erupción, acné, prurito, ampollas, descamación, enrojecimiento o inflamación)



ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

BOSUTINIB



www.oncologosdeloccidente.com

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A., Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cl 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646