

## INDICACIÓN:

## REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

## CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:

La Capecitabina pertenece a una clase de medicamentos llamados antimetabolitos. Actúa deteniendo o enlenteciendo el crecimiento de las células cancerosas.

**Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todas las reacciones:**

### CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

- Mantenga este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños.
- Almacénelo a temperatura ambiente y lejos de la luz, del exceso de calor y humedad, no en el baño ni en la cocina.



### RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- La presentación de la Capecitabina es en tabletas para administrarse por vía oral. Evite usar antiácidos 2 horas antes o después de tomar capecitabina.
- Se toma dos veces al día (por la mañana y por la noche).
- Se debe tomar con agua después de las comidas (30 minutos después del desayuno y la comida).
- Tome Capecitabina aproximadamente a la misma hora todos los días.
- Trague las tabletas enteras; no las parta, ni mastique ni triture, ni las disuelva en otros líquidos.
- Se recomienda que se cumpla la pauta de 12 horas de administración.



1 Erupción cutánea, hinchazón, enrojecimiento, dolor y/o descamación de la piel en las palmas de las manos y las plantas de los pies.




3 Poco apetito




2 Náuseas/Vómito /Dolor abdominal/ Estreñimiento



5 Entumecimiento y hormigueo en las manos y los pies inflamación de los pies y tobillos



4 Dolor de cabeza/Mareos/ Insomnio/Fiebre



6 Llagas en la boca Tos Irritación ocular

Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento. Los efectos secundarios de la Capecitabina pueden controlarse. Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

**Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico**



Prevención del síndrome de pies y manos. Modificación de las actividades normales en la vida diaria para reducir la fricción y la exposición al calor de las manos y los pies, durante el mayor tiempo posible. Mantenga las palmas de las manos y las plantas de los pies humectadas.



Asegúrese de tomar suficiente agua u otros líquidos cada día.



Lávese las manos con frecuencia.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Descanse mucho.



Mantenga una nutrición adecuada.



Puede estar en riesgo de infección, por lo que trate de evitar las multitudes y las personas resfriadas o que no se sientan bien, e informe a su proveedor de atención médica si tiene fiebre u observa otros signos de infección.



Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección SPF 50 o superior y ropa protectora.

**No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.**

# PRECAUCIONES:

Antes de comenzar el tratamiento con capecitabina, asegúrese de informar a su médico acerca de los demás medicamentos que toma (incluso los medicamentos formulados, los medicamentos de venta sin fórmula médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas, etc.).

No tome aspirinas ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.

Si toma warfarina como anticoagulante, podrían requerirse ajustes en sus dosis de acuerdo a los análisis de sangre.

No se aconseja la administración de capecitabina si tuvo una reacción de hipersensibilidad (alérgica) al fluorouracilo.

No se aplique ningún tipo de vacunas sin la aprobación de su médico mientras reciba tratamiento con capecitabina.

Si está embarazada o cree que puede estarlo, comuníquelo a su médico antes de comenzar el tratamiento. Capecitabina.

Tanto para hombres como para mujeres: Evite la concepción mientras reciba tratamiento con Capecitabina. Se recomiendan los métodos anticonceptivos de barrera, como los condones. Consulte a su médico cuándo podrá concebir sin riesgos para el bebé después del tratamiento.

No amamante mientras esté en tratamiento con capecitabina.

Puede experimentar somnolencia o mareos; evite conducir o realizar tareas que requieran estar alerta hasta que conozca cuál es su respuesta al fármaco.

**Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.**

## SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Si tiene fiebre de (38 °C) o más, o escalofríos (posibles signos de infección).
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con los medicamentos recetados).
- Vómitos (4 ó 5 veces en un período de 24 horas).
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Hemorragias o hematomas inusuales.
- deposiciones negras o alquitranadas, o presencia de sangre en las heces o la orina.
- Estreñimiento.
- Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal).
- Llagas en la boca (enrojecimiento doloroso, hinchazón o úlceras).
- Hinchazón, enrojecimiento y/o dolor sólo en una pierna o en un brazo y no en ambas piernas o en ambos brazos.
- Coloración amarillenta de la piel o los ojos.
- Hormigueo o ardor, enrojecimiento, hinchazón de las palmas de las manos o las plantas de los pies.
- Confusión, pérdida del equilibrio, somnolencia excesiva.

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

# CAPECITABINA



Servicio Farmacéutico  
Programa de Atención Farmacéutica,  
Oncólogos del Occidente S.A.S

Armenia  
Sede ppal. Av. Centenario  
Cra. 6 A N° 2-63  
7383100  
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira  
Clínica de Alta Tecnología Maraya  
Cll 50 N° 13-10  
3310712 Ext 468  
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales  
Sede San Marcel  
Calle 92 N° 29-75  
Hospital Universitario Infantil  
Calle 48 N° 25-71  
8933440-8742494

Cartago  
Cra 2 N° 23-12  
2144646