

## INDICACIÓN:

El acetato de Ciproterona reduce la cantidad de testosterona producida por su cuerpo. Esto reduce los niveles de testosterona y puede reducir el cáncer de próstata o detener su crecimiento.

### CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños.

Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño ni en la cocina).



### RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Tome la Ciproterona después de las comidas y trague las tabletas enteras con un vaso de agua.
- No tome una dosis doble si se olvida de tomar su tableta. Simplemente tome su siguiente dosis a la hora habitual.
- Tome la Ciproterona más o menos a la misma hora todos los días.



## REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

**Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:**



**Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico.**

Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento. Los efectos secundarios de la Ciproterona pueden controlarse. Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

## CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Beba diariamente suficiente líquido para mantenerse hidratado.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Mantenga una nutrición adecuada.



Si experimenta sofocaciones, usar ropa liviana, mantener un ambiente fresco y colocarse paños fríos en la cabeza pueden reducir los síntomas.



Descanse mucho



No interrumpa el tratamiento con Ciproterona, a menos que se lo indique su médico. Tome el medicamento exactamente como se le indicó.



Debe advertirse a los pacientes cuya actividad exija gran concentración (p. ej., conductores de vehículos, operadores de maquinaria), que la Ciproterona puede producir cansancio y disminución de la vitalidad y puede empeorar la capacidad de concentración.

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

## PRECAUCIONES:

- Antes de comenzar el tratamiento con Ciproterona, asegúrese de informar a su médico acerca de los demás medicamentos que toma (incluso los medicamentos recetados, los medicamentos de venta sin receta médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas, etc.).
- En pacientes diabéticos debe ajustarse la dosis de hipoglucemiantes orales y de insulina.
- No interrumpa el tratamiento con Ciproterona sin antes consultar a su médico.
- Informar al médico si consume estatinas (medicamentos para el control del colesterol ej: Atorvastatina, Lovastatina entre otros).
- Si se usa la Ciproterona en mujeres esta contraindicado en el embarazo y lactancia.
- Informe a su médico si tiene o ha tenido alguna enfermedad cardiovascular y/o en el hígado.
- No puede consumirse simultáneamente con preparaciones que contengan Hierba de San Juan.

## SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Dolor de pecho.
- Dificultad para respirar.
- Dolor en el abdomen.
- Color amarillo en la piel.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.



**ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE**  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

**CIPROTERONA**



[www.oncologosdeloccidente.com](http://www.oncologosdeloccidente.com)

Servicio Farmacéutico  
Programa de Atención Farmacéutica,  
Oncólogos del Occidente S.A.S

**No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.**

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

Armenia  
Sede ppal. Av. Centenario  
Cra. 6 A N° 2-63  
7383100  
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira  
Clinica de Alta Tecnologia Maraya  
Cll 50 N° 13-10  
3310712 Ext 468  
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales  
Sede San Marcel  
Calle 92 N° 29-75  
Hospital Universitario Infantil  
Calle 48 N° 25-71  
8933440-8742494

Cartago  
Cra 2 N° 23-12  
2144646