

## INDICACIÓN:

El Crizotinib pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la cinasa. Actúa bloqueando la acción de una determinada sustancia que se produce naturalmente, la cual puede ser necesaria para ayudar en la multiplicación de las células cancerosas

### CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.



Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad.

No guardar en el baño ni en la cocina.

### RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Tomar el medicamento por vía oral dos veces al día con un vaso de agua.
- Consumir el medicamento una hora antes o dos horas después de comer
- Ingerir el medicamento a la misma hora todos los días.



## REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

**Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:**



- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Crizotinib pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

**Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico**

## CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia.



Evitar el contacto con el sol, utilice siempre protector solar con un factor de protección igual o superior a SPF 50, utilice ropa protectora.



Hay medicamentos que pueden interactuar con este tratamiento, informe que medicamentos está tomando y así evitar un fallo terapéutico en su tratamiento.



Evite quedar en embarazo o que su pareja quede en embarazo. Consulte con su médico el método anticonceptivo ideal para su tratamiento.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



No tome jugo de pomelo o toronja ni coma esta fruta durante el consumo del Crizotinib.

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

## PRECAUCIONES:

- No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.
- Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebé.
- No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.
- No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consultar a su médico o farmacéutico. El hipérico o "hierba de San Juan" puede reducir la eficacia de este fármaco.
- Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.



## SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Vómitos (4 ó 5 veces en un período de 24 horas).
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Hemorragias o presencia de sangre en las de o en la orina.
- Fatiga extrema.



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

**ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE**  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

**CRIZOTINIB**



[www.oncologosdeloccidente.com](http://www.oncologosdeloccidente.com)

**Servicio Farmacéutico**  
**Programa de Atención Farmacéutica,**  
**Oncólogos del Occidente S.A.S**

**No deje que ninguna otra persona  
tome sus medicamentos.**

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del  
Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución  
2015018305 de 11-05-2015

Armenia  
Sede ppal. Av. Centenario  
Cra. 6 A N° 2-63  
7383100  
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira  
Clinica de Alta Tecnologia Maraya  
Cll 50 N° 13-10  
3310712 Ext 468  
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales  
Sede San Marcel  
Calle 92 N° 29-75  
Hospital Universitario Infantil  
Calle 48 N° 25-71  
8933440-8742494

Cartago  
Cra 2 N° 23-12  
2144646