

## INDICACION:

Dasatinib pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la quinasa. Funciona al bloquear la acción de una proteína anormal que envía señales a las células del cáncer para que se multipliquen. Esto ayuda a detener la propagación de las células del cáncer.

### CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad.

No guardar en el baño ni en la cocina.

### RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Dasatinib es un comprimido que se toma por vía oral.
- Por lo general se toma una vez al día, en la mañana o en la tarde, con o sin alimentos.
- Tome Dasatinib aproximadamente a la misma hora todos los días tal y como se le indica. No tome una cantidad mayor ni menor del medicamento.
- Trague las tabletas enteras; no las parta, mastique ni triture. Utilice guantes de látex o nitrilo cuando manipule las tabletas que accidentalmente se trituraron o quebraron para evitar el contacto con el medicamento.



## REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

**Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:**



- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Dasatinib pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

**Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico**

## CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia.



Puede estar en riesgo de infección, por lo que trate de evitar las multitudes y las personas resfriadas o que no se sientan bien, e informe a su proveedor de atención médica si tiene fiebre u observa otros signos de infección.



Beba diariamente suficiente cantidad de líquido, a menos que se le haya indicado limitar el consumo, Esto disminuirá sus probabilidades de sufrir estreñimiento y evitará la deshidratación.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Descanse mucho.



No tome jugo de pomelo o toronja ni coma esta fruta.



Mantenga una buena nutrición.

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

## PRECAUCIONES:

No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.

Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebé.

No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.

No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consultar a su médico o farmacéutico. El hipérico o "hierba de San Juan" puede reducir la eficacia de este fármaco.

Tanto para hombres como para mujeres: Evite la concepción mientras tome Dasatinib.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.

Dasatinib puede interactuar con varios medicamentos comunes. Asegúrese de informar a su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento nuevo.



## SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Si tiene fiebre de (38 °C) o más, o escalofríos (posibles signos de infección).
- Si experimenta hemorragias o si le aparecen hematomas con facilidad.
- Hinchazón, aumento de peso o mayor dificultad para respirar.
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con los medicamentos recetados).
- Vómitos (4 ó 5 episodios en un período de 24 horas).
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Hemorragias o hematomas inusuales.
- Deposiciones negras, o presencia de sangre en las heces.
- Sangre en la orina y/o Dolor o ardor al orinar.
- Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal).
- Llagas en la boca (enrojecimiento doloroso, hinchazón o úlceras).

[www.oncologosdeloccidente.com](http://www.oncologosdeloccidente.com)

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

# DASATINIB



**No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.**

Armenia  
Sede ppal. Av. Centenario  
Cra. 6 A N° 2-63  
7383100  
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira  
Clínica de Alta Tecnología Maraya  
Cl 50 N° 13-10  
3310712 Ext 468  
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales  
Sede San Marcel  
Calle 92 N° 29-75  
Hospital Universitario Infantil  
Calle 48 N° 25-71  
8933440-8742494

Cartago  
Cra 2 N° 23-12  
2144646