

## INDICACIÓN:

El Erlotinib pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la cinasa. Actúa bloqueando la acción de una proteína anormal que les indica a las células cancerosas que deben multiplicarse. Esto ayuda a retardar o detener la propagación de dichas células.

### CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.



Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad.



No guardar en el baño ni en la cocina.

### RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Tomar el medicamento por vía oral una vez al día con un vaso de agua.
- Consumir el medicamento una hora antes o dos horas después de comer
- Ingerir el medicamento a la misma hora todos los días.
- Si se olvida de tomar una dosis, no tome una dosis doble al día siguiente.
- Si está tomando antiácidos (omeprazol, lanzoprazol, milanta entre otros), tómelos 12h horas antes o después de tomar Erlotinib.



## REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

***Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:***



- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Erlotinib pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

**Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico**

## CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia.



Evitar el contacto con el sol, utilice siempre protector solar con un factor de protección igual o superior a SPF 50, utilice ropa protectora.



Hay medicamentos que pueden interactuar con este tratamiento, informe que medicamentos está tomando y así evitar un fallo terapéutico en su tratamiento.



Evite quedar en embarazo o que su pareja quede en embarazo. Consulte con su médico el método anticonceptivo ideal para su tratamiento.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



No tome jugo de pomelo o toronja ni coma esta fruta durante el consumo del Erlotinib.

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

## PRECAUCIONES:

- No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.
- Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebé.
- No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.
- No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consultar a su médico o farmacéutico. El hipérico o "hierba de San Juan" puede reducir la eficacia de este fármaco.
- Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.



## SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Diarrea y vómitos (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con los medicamentos recetados).
- Incapacidad de comer o beber durante 24 horas o signos de deshidratación: cansancio, sed, sequedad bucal, orina oscura y en menor cantidad o mareos.
- Irritación ocular.



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

**ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE**  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

**ERLOTINIB**



[www.oncologosdeloccidente.com](http://www.oncologosdeloccidente.com)

**Servicio Farmacéutico**  
**Programa de Atención Farmacéutica,**  
**Oncólogos del Occidente S.A.S**

**No deje que ninguna otra persona  
tome sus medicamentos.**

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del  
Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución  
2015018305 de 11-05-2015

Armenia  
Sede ppal. Av. Centenario  
Cra. 6 A N° 2-63  
7383100  
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira  
Clínica de Alta Tecnología Maraya  
Cll 50 N° 13-10  
3310712 Ext 468  
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales  
Sede San Marcel  
Calle 92 N° 29-75  
Hospital Universitario Infantil  
Calle 48 N° 25-71  
8933440-8742494

Cartago  
Cra 2 N° 23-12  
2144646