

INDICACIÓN:

Everolimus trata el cáncer al evitar que las células cancerígenas se reproduzcan y disminuyendo el suministro de sangre a las células cancerígenas. Everolimus previene el rechazo al disminuir la actividad del sistema inmune.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

- Mantenga este medicamento en el empaque en blíster en el que venía, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños.
- Guárdelo a temperatura ambiente y lejos de la luz y el exceso de calor y humedad (no en el baño).
- Mantenga los paquetes en blíster y las tabletas secos.



RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- El Everolimus se administra en forma de tabletas, por vía oral.
- Tome este fármaco a la misma hora todos los días; puede tomarlo antes o después de las comidas.
- Trague la tableta entera y con un vaso de agua; no mastique ni aplaste las tabletas.
- Evite el contacto o exposición con tabletas aplastadas o rotas.
- Si se olvida de tomar una dosis, no tome una dosis doble al día siguiente.



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todas las reacciones:



Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento. Los efectos secundarios del Everolimus pueden controlarse. Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



No coma o tome jugo de toronja mientras este en tratamiento con Everolimus.



Puede estar en riesgo de infección, por lo que trate de evitar las multitudes o las personas resfriadas.



Evitar el contacto con el sol, utilice siempre protector solar con un factor de protección igual o superior a SPF 50, utilice ropa protectora.



Lávese las manos con frecuencia.



Mantenga una nutrición e hidratación adecuada.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico.

PRECAUCIONES:

- Antes de comenzar el tratamiento con Everolimus, asegúrese de informar a su médico acerca de **TODOS** los demás medicamentos que toma incluidos suplementos, fitoterapéuticos y homeopáticos.
- No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.
- No se aplique ningún tipo de vacunas sin la aprobación de su médico mientras reciba tratamiento con Everolimus.
- Si está embarazada o cree que puede estarlo, comuníquelo a su médico antes de comenzar el tratamiento este medicamento implica riesgo para el bebe.
- Tanto para hombres como para mujeres: Evite el embarazo durante el tratamiento.
- No amamante mientras recibe el medicamento.
- Si va a tener una cirugía, incluyendo cirugía dental, informe al médico u odontólogo que está tomando Everolimus.
- Indique a su médico qué productos de hierbas está tomando, especialmente hierba de San Juan.
- Informe a su médico si tiene o ha tenido diabetes o azúcar alta; niveles altos de colesterol o triglicéridos en la sangre; enfermedad renal o hepática; o cualquier condición que le impida digerir alimentos que contienen azúcar, almidón o productos lácteos normalmente.



Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.

SEÑALES DE ALERTA

- Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:
- Fiebre (38 °C) o más, escalofríos (posibles signos de infección).
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con los medicamentos formulados).
- Vómitos (4 o 5 veces en un período de 24 horas).
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Hemorragias o hematomas inusuales.
- Deposiciones negras o alquitranadas, o presencia de sangre en las heces.
- Sangre en la orina.
- Dolor o ardor al orinar.
- Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal).
- Llagas en la boca (enrojecimiento doloroso, hinchazón o úlceras).

No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

www.oncologosdeloccidente.com



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

EVEROLIMUS



Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica,
Oncólogos del Occidente S.A.S

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cll 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646