

INDICACIÓN:

REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:

Ibrutinib pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la quinasa. Funciona al bloquear la acción de la proteína anormal que envía señales a las células del cáncer para que se multipliquen. Esto ayuda a detener la propagación de las células del cáncer.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

- Mantenga este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños.
- Almacénelo a temperatura ambiente y lejos de la luz, del exceso de calor y humedad, no en el baño ni en la cocina.



RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- El ibrutinib es una cápsula que se toma por vía oral, una vez al día. El número de capsulas a tomar dependerá de la formulación médica.
- Tome el medicamento aproximadamente a la misma hora todos los días.
- Tome el ibrutinib exactamente como se lo indiquen.
- Trague la capsula entera con al menos un vaso de agua.
- No aplaste, abra, mastique ni disuelva las cápsulas.



No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



1

• Vómito.
• Náuseas.
• Diarrea
• Estreñimiento
• Dolor de estómago
• Acidez o indigestión

2

Pérdida del apetito.

3

• cansancio o debilidad excesivos
• dolor de los músculos, los huesos, y las articulaciones
• espasmos musculares

4

inflamación de las manos, pies, tobillos o parte inferior de las piernas

5

• Ansiedad, dificultad para quedarse o permanecer dormido

6

Dificultad para respirar
sarpullido, picazón, mareos, llagas en la boca y garganta.

Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.

Los efectos secundarios del Ibrutinib pueden controlarse. Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.



No coma toronja ni tome jugo de toronja mientras está tomando este medicamento.



Asegúrese de tomar suficiente agua u otros líquidos cada día mientras toma ibrutinib



No deje de tomar sus comprimidos incluso si se siente bien y no cambie la dosis ni interrumpa el tratamiento sin hablarlo antes con su médico.



Por lo general, se debe reducir al mínimo o evitar por completo el consumo de bebidas alcohólicas.



Muchos medicamentos pueden interactuar con la quimioterapia, informe siempre los medicamentos que toma para evitar fallo terapéutico.



Mantenga una nutrición adecuada.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

PRECAUCIONES:

Antes de comenzar el tratamiento con Ibrutinib, asegúrese de informar a su médico acerca de los demás medicamentos que toma (incluso los medicamentos formulados, los medicamentos de venta sin fórmula médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas, etc.).



No se aplique ningún tipo de vacunas sin la aprobación de su médico.



Limite el tiempo de exposición al sol. El Ibrutinib puede hacer que su piel se vuelva sensible a la luz solar, recuerde usar un protector solar, así como un sombrero y prendas de vestir que cubran la mayor cantidad de piel que sea posible.



Si está embarazada o cree que puede estarlo, infórmele a su médico antes de comenzar el tratamiento ya que puede ser un riesgo para el bebé.



Tanto para hombres como para mujeres: Se recomienda usar métodos anticonceptivos de barrera, como los condones, durante el tratamiento y mínimo 2 semanas después de haberlo terminado. Consulte a su médico cuándo podrá concebir sin riesgos para el bebé después del tratamiento.



No amamante mientras esté en tratamiento con Ibrutinib.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.

SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- ✓ Fiebre de (38 °C) o más, escalofríos.
- ✓ Tos constante con producción o sin producción de mucosidad o dificultad para respirar.
- ✓ Cualquier hemorragia que no se detiene.
- ✓ Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- ✓ Presencia de sangre en las heces o heces de color oscuro.
- ✓ Dolor de cabeza que dura mucho tiempo, confusión, cambios en el habla.
- ✓ Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con los medicamentos recetados).
- ✓ Vómitos (más de 4 o 5 veces en un período de 24 horas).
- ✓ Incapacidad de comer o beber durante 24 horas o signos de deshidratación: cansancio, sed, sequedad bucal, orina oscura y en menor cantidad o mareos.
- ✓ Color amarillento de la piel o los ojos.
- ✓ Orina de color oscuro o marrón (del color del té).
- ✓ Dolor en la parte derecha del estómago.
- ✓ Sufre hemorragias o hematomas con mayor facilidad que de costumbre.
- ✓ Cualquier alteración en la piel o las uñas (sarpullido, prurito, resequedad severa, ampollas, infección en las uñas, inflamación de los labios, etc.).
- ✓ Llagas en la boca, enrojecimiento doloroso, hinchazón o úlceras.
- ✓ Dolor o ardor al orinar.

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

IBRUTINIB



Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica,
Oncólogos del Occidente S.A.S

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cll 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646