

INDICACION:

El lapatinib pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la cinasa. Actúa bloqueando la acción de la proteína anormal que les indica a las células cancerosas que deben multiplicarse. Esto ayuda a detener o retardar la propagación de dichas células.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad.



No guardar en el baño ni en la cocina.

RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACION

- El lapatinib es una pastilla que se toma por vía oral.
- El lapatinib debe tomarse por lo menos una hora antes, o una hora después, de las comidas.
- Tome todas las tabletas de su dosis diaria de una sola vez todos los días; no divida las tabletas para tomarlas en dosis separadas.
- Tome el lapatinib aproximadamente a la misma hora todos los días.
- Tome el lapatinib según lo indicado. No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico.
- Trague las tabletas enteras; no las parta, mastique ni triture.
- Si se olvida de tomar una dosis, no tome una dosis doble al día siguiente.



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Lapatinib pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia. Mantenga las palmas de las manos y las plantas de los pies humectadas.



Puede estar en riesgo de infección, por lo que trate de evitar las multitudes y las personas resfriadas o que no se sientan bien, e informe a su médico si tiene fiebre u observa otros signos de infección.



Beba diariamente suficiente cantidad de líquido, a menos que se le haya indicado limitar el consumo, esto disminuirá sus probabilidades de sufrir estreñimiento y evitará la deshidratación.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Descanse mucho.



No tome jugo de pomelo o toronja ni coma esta fruta.



Mantenga una buena nutrición

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

PRECAUCIONES:

No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.

Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebé.

No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.

No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consultar a su médico o farmacéutico. El hipérico o "hierba de San Juan" puede reducir la eficacia de este fármaco.

Tanto para hombres como para mujeres: evite la concepción mientras tome Lapatinib.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.

Lapatinib puede interactuar con varios medicamentos comunes. Asegúrese de informar a su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento nuevo.



SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Si tiene fiebre de (38 °C) o más, o escalofríos (posibles signos de infección).
- Palpitaciones o dificultad para respirar.
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con los medicamentos recetados).
- Vómitos (4 ó 5 episodios en un período de 24 horas).
- Hormigueo o ardor, enrojecimiento, hinchazón de las palmas de las manos o las plantas de los pies.
- Hemorragias o hematomas inusuales.
- Deposiciones negras, o presencia de sangre en las heces.
- Sangre en la orina.
- Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal).
- Llagas en la boca (enrojecimiento doloroso, hinchazón o úlceras).
- Incapacidad de comer o beber durante 24 horas o signos de deshidratación: cansancio, sed, sequedad bucal, orina oscura y en menor cantidad o mareos.

www.oncologosdeloccidente.com

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

LAPATINIB



Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica,
Oncólogos del Occidente S.A.S

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cl 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646

**No deje que ninguna otra persona
tome sus medicamentos.**