

INDICACIONES

La Lenalidomida pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes inmunomoduladores. Funciona al ayudar a la médula ósea a producir glóbulos normales y al matar las células anormales en la médula ósea.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

- Mantenga este medicamento en el empaque en blíster en el que venía, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños.
- Guárdelo a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C y protegidos de la luz y el exceso de calor y humedad (no en el baño ni en la cocina).



RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACION

- Lenalidomida se toma por vía oral, en forma de cápsulas deben tragarse enteras, con agua.
- Se puede toma con o sin alimentos.
- No rompa, mastique ni abra las cápsulas.
- Si se olvida de tomar una dosis, no tome una dosis doble al día siguiente.
- Manipule las cápsulas tan poco como sea necesario. Si toca una cápsula de Lenalidomida rota o el medicamento dentro de la cápsula, lave esa área o su cuerpo con jabón y agua. Si el medicamento de la cápsula entra en su boca, nariz u ojos, lávelo con mucha agua.
- Tome la Lenalidomida aproximadamente a la misma hora del día todos los días.



REACCIONES ADVERSAS

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.

Los efectos secundarios de la Lenalidomida pueden controlarse.

Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico.

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Mantenga una buena nutrición.



Descanse mucho.



Beba diariamente suficiente cantidad de líquido, a menos que se le haya indicado limitar el consumo, Esto disminuirá sus probabilidades de sufrir estreñimiento y evitará la deshidratación.



Lávese las manos con frecuencia.



Evitar el contacto con el sol, utilice siempre protector solar con un factor de protección igual o superior a SPF 50, utilice ropa protectora.



No done sangre mientras recibe este medicamento.




Evite el consumo de bebidas alcohólicas.

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

PRECAUCIONES

- Antes de comenzar el tratamiento con Lenalidomida, asegúrese de informar a su médico acerca de los demás medicamentos que toma (incluso los medicamentos formulados, los medicamentos de venta sin fórmula médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas, etc.).
- No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.
- No se aplique ningún tipo de vacunas sin la aprobación de su médico.
- Lenalidomida es similar a la talidomida, un medicamento que se sabe que causa anomalías congénitas graves fatales. No amamante mientras esté en tratamiento con Lenalidomida.
- Este fármaco no debe administrarse a una mujer embarazada o que desee quedar embarazada. Si una mujer se embaraza durante el tratamiento con Lenalidomida, el medicamento debe interrumpirse de inmediato y la mujer debe recibir asesoramiento adecuado.
- Se exige la utilización de dos métodos seguros de anticoncepción 4 semanas antes de la terapia, durante la terapia y 4 semanas después de la terapia, así como también durante los períodos de interrupción.
- Los hombres (incluso aquellos que se hayan sometido a una vasectomía) deben utilizar un condón de látex siempre que tengan relaciones sexuales con mujeres en edad fértil. Se desconoce el riesgo para los fetos concebidos con semen de pacientes masculinos.



No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.

SEÑALES DE ALERTA

- Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:
- Si tiene fiebre (38 °C) o más, o escalofríos (posibles signos de infección).
- Hemorragias o hematomas inusuales.
- Deposiciones negras o alquitranadas, o presencia de sangre en las heces.
- Sangre en la orina.
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesa con los medicamentos recetados).
- Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal).
- Hinchazón en brazos o piernas, enrojecimiento, dolor o calor al tacto.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

www.oncologosdeloccidente.com



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

LENALIDOMIDA



**Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica,
Oncólogos del Occidente S.A.S**

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cll 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646