

## INDICACIÓN:

El Letrozol pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la aromatasa no esteroide. Actúa disminuyendo la cantidad de estrógeno que produce el cuerpo. Esto puede retardar o detener el crecimiento de algunos tipos de células del cáncer de seno que necesitan estrógeno para crecer.

### CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños.

Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño ni en la cocina).



### RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACION

- Letrozol es un medicamento que se toma por vía oral una vez al día preferiblemente en horas de la noche (antes de acostarse).
- Debe tomar letrozol aproximadamente a la misma hora todos los días.
- Si se olvida de tomar una dosis, no tome una dosis doble al día siguiente.
- No debería abandonar el medicamento sin consultar a su médico.



## REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todas las reacciones:



Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.

Los efectos secundarios del Letrozol pueden controlarse. Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

## CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección solar SPF 50 o superior y ropa protectora.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Mantenga una nutrición e hidratación adecuada.



Si experimenta sofocaciones, usar ropa liviana, mantener un ambiente fresco y colocarse paños fríos en la cabeza pueden reducir los síntomas.



Descanse mucho.

**Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico.**

## PRECAUCIONES:

- Antes de comenzar el tratamiento con letrozol, asegúrese de informar a su médico acerca de los demás medicamentos que toma (incluso los medicamentos formulados, los medicamentos de venta sin fórmula médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas, etc.).
- No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.
- Informe a su médico si tiene colesterol alto, osteoporosis (una afección en la que los huesos son frágiles y se quiebran fácilmente) o una enfermedad del hígado.
- Tenga presente que solo deben tomar letrozol las mujeres que han experimentado la menopausia y que no pueden quedar embarazadas. No obstante, si está embarazada o dando el pecho, debe decírselo a su médico antes de comenzar a tomar este medicamento. El letrozol puede causarle daños al feto.
- Tenga en cuenta que el letrozol puede causarle somnolencia. No conduzca vehículos ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.



## SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con la medicación formulada).
- Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal).
- Dolor que no se alivia con el medicamento formulado.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.

[www.oncologosdeloccidente.com](http://www.oncologosdeloccidente.com)



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

# LETROZOL



Servicio Farmacéutico  
Programa de Atención Farmacéutica,  
Oncólogos del Occidente S.A.S

**No deje que ninguna otra persona  
tome sus medicamentos.**

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del  
Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución  
2015018305 de 11-05-2015

Armenia  
Sede ppal. Av. Centenario  
Cra. 6 A N° 2-63  
7383100  
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira  
Clínica de Alta Tecnología Maraya  
Cll 50 N° 13-10  
3310712 Ext 468  
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales  
Sede San Marcel  
Calle 92 N° 29-75  
Hospital Universitario Infantil  
Calle 48 N° 25-71  
8933440-8742494

Cartago  
Cra 2 N° 23-12  
2144646