


INDICACION

El melfalán pertenece a una clase de medicamentos denominados agentes alquilantes. Actúa deteniendo o enlenteciendo el crecimiento de las células cancerosas en el cuerpo.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.



Almacenar en la parte central de la nevera y protegido de la luz.


RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACION

- Tomar el medicamento por vía oral una vez al día con un vaso de agua.
- Consumir el medicamento con el estómago vacío: una hora antes o dos horas después de comer.
- Ingerir el medicamento a la misma hora todos los días.
- Si olvida tomar el medicamento, no tomar doble dosis al día siguiente.



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Melfalan pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia.



Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección solar (SPF) 50 o superior y ropa protectora.



Hay medicamentos que pueden interactuar con este tratamiento, informe que medicamentos está tomando y así evitar un fallo terapéutico en su tratamiento.



Evite quedar en embarazo o que su pareja quede en embarazo. Consulte con su médico el método anticonceptivo ideal para su tratamiento.



Reduzca o evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Puede estar en riesgo de infección, por lo que trate de evitar las multitudes y las personas resfriadas o que no se sientan bien, e informe a su médico si tiene fiebre u observa otros signos de infección.

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

SEÑALES DE ALERTA

PRECAUCIONES:

No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.

Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebé.

No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.

No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consulta a su médico o farmacéutico.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo las que recibió con fórmula médica y las que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.



No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.

Los síntomas a continuación requieren atención médica, pero no son situaciones de emergencia. Consulte con su médico si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con la medicación prescrita).
- Vómitos (4 ó 5 veces en un período de 24 horas).
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Hemorragias o hematomas inusuales.
- Deposiciones negras o presencia de sangre en las heces o la orina.
- Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal).
- Llagas en la boca (enrojecimiento doloroso, hinchazón o úlceras).
- Coloración amarillenta de la piel o los ojos.
- Signos de infección tales como enrojecimiento o inflamación, dolor al tragar, tos con expectoración o micción dolorosa.



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

MELFALAN

Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica,
Oncólogos del Occidente S.A.S

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

www.oncologosdeloccidente.com

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cll 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646