

INDICACIÓN:

La Mercaptopurina pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas de purinas. Actúa interrumpiendo el crecimiento de las células cancerosas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.



Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad.



No guardar en el baño ni en la cocina.

RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACION

- Tomar el medicamento por vía oral una vez al día con un vaso de agua.
- Consumir el medicamento con el estómago vacío: una hora antes o dos horas después de comer
- Ingerir el medicamento a la misma hora todos los días.
- Si olvida tomar el medicamento, no tomar doble dosis al día siguiente



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



- Los efectos secundarios de la Mercaptopurina pueden controlarse. Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia.



Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección solar SPF 50 o superior y ropa protectora.



Hay medicamentos que pueden interactuar con este tratamiento, informe que medicamentos está tomando y así evitar un fallo terapéutico en su tratamiento.



Evite quedar en embarazo o que su pareja quede en embarazo. Consulte con su médico el método anticonceptivo ideal para su tratamiento.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Puede estar en riesgo de infección, por lo que trate de evitar las multitudes y las personas resfriadas o que no se sientan bien, e informe a su médico si tiene fiebre u observa otros signos de infección.

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

PRECAUCIONES:

No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.

No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.

Si toma warfarina o alopurinol coménteles a su médico, es posible que se deba de ajustar la dosis de estos medicamentos.

Si está recibiendo tratamiento para colitis ulcerosas, cuénteles a su médico acerca de este riesgo

No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.

No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consultar a su médico o farmacéutico

Es importante que mantenga una lista escrita de todas los medicamentos que está tomando, incluyendo las que recibió con fórmula médica y las que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.



No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.

SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas a continuación requieren atención médica, pero no son situaciones de emergencia. Consulte con su médico si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Color amarillo de la piel o los ojos.
- Hemorragias o hematomas inusuales.
- Depositiones negras o presencia de sangre en ellas o en la orina.
- Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal).
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con la medicación recetada).
- Vómitos (4 ó 5 veces en un período de 24 horas).
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Llagas en la boca (enrojecimiento doloroso, hinchazón o úlceras).
- Signos de infección tales como enrojecimiento o inflamación, dolor al tragar, tos con expectoración.
- Dolor para orinar.



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

MERCAPTOPURINA

www.oncologosdeloccidente.com

Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica
Oncólogos del Occidente S.A.S

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cll 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646