

INDICACIÓN:

El metotrexate pertenece a una clase de medicamentos llamados antimetabolitos. Este medicamento ataca el cáncer retardando el crecimiento de células cancerosas. También trata la psoriasis retardando el crecimiento de células cutáneas para interrumpir la descamación. El metotrexato puede tratar la artritis reumatoide al disminuir la actividad del sistema inmunitario.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad.

No guardar en el baño ni en la cocina

RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Tomar el medicamento por vía oral con un vaso de agua.
- El medicamento a veces se toma una o dos veces por semana, tenga en cuenta las recomendaciones de su médico.
- Consumir el medicamento con el estómago vacío: una hora antes o dos horas después de comer.
- Ingerir el medicamento a la misma hora todos los días.
- Si olvida tomar el medicamento, no tomar doble dosis al día siguiente.



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



1

Somnolencia



3

Inflamación y sensibilidad en las encías.



5

Perdida del cabello
Ojos rojos



2

Mareos.



4

Dolor de cabeza.



6

Pérdida del apetito.

- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Metotrexate pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia.



Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección solar SPF 50 o superior y ropa protectora.



Hay medicamentos que pueden interactuar con este tratamiento, informe que medicamentos está tomando y así evitar un fallo terapéutico en su tratamiento.



Evite quedar en embarazo o que su pareja quede en embarazo. Consulte con su médico el método anticonceptivo ideal para su tratamiento.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Puede estar en riesgo de infección, por lo que trate de evitar las multitudes y las personas resfriadas o que no se sientan bien, e informe a su médico si tiene fiebre u observa otros signos de infección.

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

SEÑALES DE ALERTA

PRECAUCIONES:

- Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebe.
- No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.
- No tome medicamentos como ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco sin que su médico se lo autorice.
- Deben evitarse los suplementos de ácido fólico mientras esta tomando Metotrexate. El ácido fólico disminuye los efectos terapéuticos del Metotrexate.
- Si toma warfarina coménteles a su médico, es posible que se deba de ajustar la dosis de estos medicamentos.
- No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consulta a su médico o farmacéutico
- No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con formula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.



No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Si tiene fiebre de (38 °C) o más, o escalofríos (posibles signos de infección).
- Hemorragias o hematomas inusuales.
- Deposiciones negras o presencia de sangre en ellas o en la orina.
- Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal).
- Llagas en la boca (enrojecimiento doloroso, hinchazón o úlceras).
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con la medicación recetada).
- Vómitos (4 ó 5 veces en un período de 24 horas).
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Producción de orina nula en un período de 12 horas.
- Coloración amarillenta de la piel o los ojos.
- Hinchazón de los pies o tobillos. Aumento repentino de peso.
- Signos de infección tales como enrojecimiento o inflamación, dolor al tragar, tos con expectoración o micción dolorosa.
- Si no puede comer o beber durante 24 horas o muestra signos de deshidratación: cansancio, sed, sequedad bucal, orina oscura y en menor cantidad o mareos.



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

METOTREXATE

Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica
Oncólogos del Occidente S.A.S

www.oncologosdeloccidente.com

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A..S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cll 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646