

INDICACIÓN:

El Mitotano pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes antineoplásicos. Actúa haciendo mas lento el crecimiento de las células cancerosas en el cuerpo.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad.

No guardar en el baño ni en la cocina



RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Tomar el medicamento por vía oral con un vaso de agua.
- El medicamento a veces se toma dos o tres veces por día, tenga en cuenta las recomendaciones de su médico.
- Consumir el medicamento durante las comidas.
- Ingerir el medicamento a la misma hora todos los días.
- Si olvida tomar el medicamento, no tomar doble dosis al día siguiente.



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Mitotano pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia.



Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección solar SPF 50 o superior y ropa protectora.



Hay medicamentos que pueden interactuar con este tratamiento, informe que medicamentos está tomando y así evitar un fallo terapéutico en su tratamiento.



Evite quedar en embarazo o que su pareja quede en embarazo. Consulte con su médico el método anticonceptivo ideal para su tratamiento.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Puede estar en riesgo de infección, por lo que trate de evitar las multitudes y las personas resfriadas o que no se sientan bien, e informe a su médico si tiene fiebre u observa otros signos de infección.

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

PRECAUCIONES:

- Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebe.
- Si toma warfarina coménteles a su medico, es posible que se deba de ajustar la dosis de este medicamento.
- No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consultar a su médico o farmacéutico.
- Si sufre alguna lesión (shock, trauma grave), tiene una infección o sufre alguna enfermedad mientras esté tomando mitotano. Informe inmediatamente a su médico que puede recomendarle, al igual si sufre trastornos de hígado o de riñón.
- El mitotano puede interferir con otros medicamentos. Por lo tanto, si toma alguno de los siguientes medicamentos debe informárselo a su medico: Rifampicina (en tratamiento de la tuberculosis)
- Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con formula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.

SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Dolor en el abdomen o el costado.
- Confusión.
- Latidos del corazón rápidos.
- Fiebre elevada o escalofríos con temblores.
- Sudoración excesiva.

No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

MITOTANO

www.oncologosdeloccidente.com

Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica
Oncólogos del Occidente S.A.S

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cll 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646

