

## INDICACIÓN:

Sorafenib pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la quinasa. Funciona al bloquear la acción de una proteína anormal que envía señales a las células del cáncer para que se multipliquen. Esto ayuda a detener la propagación de las células del cáncer.

## CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños.



Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño ni en la cocina).



## RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Sorafenib se toma sin alimentos, 1 hora antes o 2 horas después de una comida, con un vaso de agua
- Usualmente se toma dos veces al día.
- Trague las tabletas enteras con agua. No las parta, mastique ni triture.
- Ingerir el medicamento a la misma hora todos los días.
- Si olvido tomar una dosis omita la dosis que le faltó y continúe con su programa regular de dosificación. No duplique la dosis para compensar la dosis omitida.



## REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

**Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:**



1  
Erupción cutánea, hinchazón, enrojecimiento, dolor o descamación de la piel en las palmas de las manos y las plantas de los pies.  
Entumecimiento, hormigueo o dolor en las manos y los pies




2  
Vómito.  
Náuseas.  
Estreñimiento  
Dolor de estómago  
Diarrea



3  
Dificultad para respirar  
Tos  
Sarpullido  
Picazón  
Piel seca



4  
Pérdida del apetito.  
Perdida de peso.



5  
Fatiga  
Dolor de los músculos, los huesos, y las articulaciones  
Dolor de cabeza



6  
Caída del cabello



7  
Presión arterial alta

Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.

Los efectos secundarios de Sorafenib pueden controlarse. Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

## CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Lávese las manos con frecuencia.



Beba suficiente cantidad de líquido para mantener hidratado a menos que su médico le indique lo contrario.



Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección solar SPF 50 o superior y ropa protectora.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Mantenga una nutrición adecuada.



No coma o tome jugo de toronja mientras este en tratamiento con sorafenib.



Puede estar en riesgo de infección, por lo que trate de evitar las multitudes o las personas resfriadas

**Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico.**

## SEÑALES DE ALERTA

## PRECAUCIONES:

- Antes de comenzar el tratamiento con sorafenib, asegúrese de informar a su médico acerca de los *demás* medicamentos que toma (incluso los medicamentos formulados, los medicamentos de venta sin fórmula médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas, etc.).
- Sorafenib puede interactuar con determinados medicamentos y causar efectos secundarios graves. En especial, informe a su médico si está tomando warfarina.
- No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.
- No se aplique ningún tipo de vacunas sin la aprobación de su médico mientras reciba tratamiento con sorafenib.
- Si está embarazada o cree que puede estarlo, comuníquelo a su médico antes de comenzar el tratamiento.
- Tanto para hombres como para mujeres: Use anticonceptivos y evite la concepción mientras recibe sorafenib. Se recomiendan los métodos anticonceptivos de barrera, como los condones.
- No amamante mientras esté en tratamiento con sorafenib.



Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Ansiedad, sudoración fría, ritmo cardíaco acelerado, dolor intenso en el tórax y/o la mandíbula, el cuello, la espalda o los brazos, y dificultad para respirar (disnea).
- Si tiene fiebre de (38 °C) o más, o escalofríos (posibles signos de infección).
- Hormigueo o ardor, enrojecimiento, hinchazón de las palmas de las manos o las plantas de los pies.
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no ceden con los medicamentos recetados).
- Vómitos (4 ó 5 episodios en un período de 24 horas).
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Hemorragias o hematomas inusuales.
- Heces negras, o presencia de sangre en las heces.
- Sangre en la orina.
- Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal).
- Estreñimiento que considere severo.
- Signos de infección tales como enrojecimiento o inflamación, dolor al tragar, tos con expectoración o micción dolorosa.

**No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.**

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

[www.oncologosdeloccidente.com](http://www.oncologosdeloccidente.com)



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

SORAFENIB



Servicio Farmacéutico  
Programa de Atención Farmacéutica,  
Oncólogos del Occidente S.A.S

Armenia  
Sede ppal. Av. Centenario  
Cra. 6 A N° 2-63  
7383100  
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira  
Clínica de Alta Tecnología Maraya  
Cll 50 N° 13-10  
3310712 Ext 468  
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales  
Sede San Marcel  
Calle 92 N° 29-75  
Hospital Universitario Infantil  
Calle 48 N° 25-71  
8933440-8742494

Cartago  
Cra 2 N° 23-12  
2144646