


INDICACIÓN:

El tamoxifeno pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antiestrógenos. Bloquea la actividad del estrógeno (hormona femenina) en los senos. Puede detener el crecimiento de algunos tumores de seno que necesitan estrógeno para crecer.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

- Mantenga este medicamento en el empaque en blíster en el que venía, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños.
- Guárdelo a temperatura ambiente y lejos de la luz y el exceso de calor y humedad (no en el baño ni la cocina).



RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Tamoxifeno es una tableta que se toma por vía oral.
- Tome este fármaco a la misma hora todos los días; puede tomarlo antes o después de las comidas se recomienda tomarlo en la noche.
- Trague la tableta entera y con un vaso de agua; no mastique ni aplaste las tabletas.
- Si se olvida de tomar una dosis, no tome una dosis doble al día siguiente.



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.

Los efectos secundarios del Tamoxifeno pueden controlarse. Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico.

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



Si experimenta sofocaciones, usar ropa liviana, mantener un ambiente fresco y colocarse paños fríos en la cabeza pueden reducir los síntomas. Si los síntomas empeoran o se vuelven intolerables, consulte a su proveedor de atención médica.



Mantenga una nutrición e hidratación adecuada.



Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección solar SPF 50 o superior y ropa protectora.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Descanse mucho.

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

PRECAUCIONES:

Antes de comenzar el tratamiento con tamoxifeno, asegúrese de informar a su médico acerca de los demás medicamentos que toma (incluso los medicamentos recetados, los medicamentos de venta sin receta médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas, etc.).

No tome aspirinas ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.

Informe a su profesional de atención médica si alguna vez tuvo un coágulo sanguíneo que requiriese tratamiento médico.

Si está embarazada o cree que puede estarlo, comuníquelo a su profesional de atención médica antes de comenzar el tratamiento con tamoxifeno, ya que puede ser un riesgo para el bebé.

Las mujeres embarazadas o que quedan embarazadas durante el tratamiento deben ser informadas acerca del posible riesgo para el feto.

Tanto para hombres como para mujeres: Evite la concepción mientras tome tamoxifeno. Se recomiendan los métodos anticonceptivos de barrera, como los condones. Consulte a su médico cuándo podrá concebir sin riesgos para el bebé después del tratamiento.

No amamante mientras recibe este medicamento



Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.

SEÑALES DE ALERTA

Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Dificultad repentina para respirar y/o dolor en el pecho.
- Hinchazón, enrojecimiento y/o dolor sólo en una pierna o en un brazo y no en ambas piernas o en ambos brazos.
- Bultos nuevos en los senos.
- Secreción o sangrado vaginal excesivo, dolor o irregularidades menstruales (período).
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con los medicamentos recetados).
- Depresión (que afecta la capacidad de continuar con las actividades regulares).
- Alteraciones en la vista.

No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos.

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

www.oncologosdeloccidente.com



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

TAMOXIFENO



Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica,
Oncólogos del Occidente S.A.S

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cll 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646