

INDICACIÓN:

La tretinoína pertenece a una clase de medicamentos llamados retinoides. Actúa al interrumpir o hacer más lento el crecimiento de las células cancerosas, al provocar que las células sanguíneas inmaduras se desarrollen hasta convertirse en células sanguíneas normales.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO

- Mantenga este medicamento en el empaque en blíster en el que venía, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños.
- Guárdelo a temperatura ambiente y lejos de la luz y el exceso de calor y humedad (no en el baño).



RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACION

- La presentación de la tretinoína son cápsulas para administrarse por vía oral.
- Tome la tretinoína más o menos a la misma hora todos los días.
- Tome la Tretinoína junto con las comidas y pásela solo con agua.
- No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico.



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, La mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento. Los efectos secundarios de la Tretinoína pueden controlarse. Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:

	Cuando comience a tomar Tretinoína, podría sufrir mareos, confusión, ansiedad o cansancio extremo. No intente manejar ni operar maquinaria pesada a menos que sepa cómo responderá a la Tretinoína.
	Evite usar lentes de contacto si tiene los ojos secos o irritados.
	Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección solar SPF 50 o superior y ropa protectora.
	Evite el consumo de bebidas alcohólicas.
	Mantenga una nutrición e hidratación adecuada.
	No coma o tome jugo de toronja mientras este en tratamiento con Tretinoína.
	Informe a su médico si es alérgico a algún medicamento y/o alimento.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

SEÑALES DE ALERTA

PRECAUCIONES

Antes de comenzar el tratamiento con Tretinoína, asegúrese de informar a su médico acerca de los demás medicamentos que toma (incluso los medicamentos formulados, los medicamentos de venta sin fórmula médica, las vitaminas, los remedios a base de hierbas, etc.).

No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a menos que su médico se lo permita específicamente.

No se aplique ningún tipo de vacunas sin la aprobación de su médico mientras reciba tratamiento con Tretinoína.

Si está embarazada o cree que puede estarlo, infórmelo a su profesional de atención médica antes de comenzar el tratamiento.

La Tretinoína es un fármaco clasificado en la categoría D (puede significar un riesgo para el feto).

Las mujeres embarazadas o que quedan embarazadas durante el tratamiento deben ser informadas acerca del posible riesgo para el feto. Ya que existe un riesgo extremadamente elevado de malformaciones fetales en caso de que el embarazo se produzca mientras el hombre o la mujer toma Tretinoína, independientemente de la dosis e incluso si el tratamiento es de corta duración: evite la embarazo mientras reciba Tretinoína. A menos que el método seleccionado sea la abstinencia absoluta, se recomienda a las mujeres en edad reproductiva que se protejan utilizando dos métodos anticonceptivos eficaces.

Consulte a su médico cuándo podrá concebir sin riesgos para el bebé después del tratamiento.

No amamante mientras esté en tratamiento con Tretinoína.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.

No deje que ninguna otra persona tome sus medicamentos



Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Si tiene fiebre de (38 °C) o más, o escalofríos (posibles signos de infección).
- Dificultad para respirar, aumento de peso súbito, hinchazón, alteraciones en la vista.
- Cualquier signo de hemorragia, incluyendo heces o presencia de sangre en las heces o la orina.
- Dolor abdominal grave.
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con los medicamentos prescritos).
- Vómitos (4 ó 5 veces en un período de 24 horas).
- Llagas en la boca (enrojecimiento doloroso, hinchazón o úlceras).
- Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Estreñimiento que no se alivia con el uso de laxantes.
- Signos de infección tales como enrojecimiento o inflamación, dolor al tragar, tos con expectoración o micción dolorosa.
- Inflamación de los pies o tobillos. Pérdida repentina de peso.
- Dolor óseo o articular.
- Coloración amarillenta de la piel o los ojos.

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución 2015018305 de 11-05-2015

www.oncologosdeloccidente.com



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

TRETINOINA



Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica,
Oncólogos del Occidente S.A.S

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Cll 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646