

INDICACION:

El vandetanib pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la cinasa. Actúa bloqueando la acción de una proteína anormal que estimula la multiplicación de células cancerosas. Esto ayuda a retardar o detener la propagación de dichas células.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO



Mantenga este medicamento en su envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Almacenar a temperatura ambiente y en un lugar alejado del calor y la humedad.



No guardar en el baño ni en la cocina.

RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN

- El vandetanib es en una tableta para administrarse por vía oral. Se toma una vez al día, con o sin alimentos.
- Tome el vandetanib aproximadamente a la misma hora todos los días.
- No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico.
- Trague las tabletas enteras con un vaso de agua. No las parta, mastique, ni triture. Si una tableta se parte accidentalmente, evite el contacto con la piel. Si se produce el contacto, lave bien el área afectada con agua.



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

Este medicamento puede producir las reacciones adversas mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:



- Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el tratamiento.
- Los efectos secundarios del Vandetanib pueden controlarse.
- Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.

Si experimenta síntomas o efectos secundarios, asegúrese de hablar de ellos con los miembros de su equipo de atención médica: Médico tratante y Químico Farmacéutico

CUIDADOS O RECOMENDACIONES ESPECIALES SI LO REQUIERE:



No tome jugo de pomelo o toronja ni coma esta fruta.



El vandetanib puede provocar cansancio, debilidad o visión borrosa. Si experimenta cualquiera de estos síntomas, sea precavido si va a conducir un automóvil, operar maquinaria o hacer cualquier otra cosa para la que deba estar alerta.



Beba diariamente suficiente cantidad de líquido, a menos que se le haya indicado limitar el consumo, esto disminuirá sus probabilidades de sufrir estreñimiento y evitará la deshidratación.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas.



Descanse mucho.



Evite la exposición al sol. Use protector solar con factor de protección (SPF) 15 o superior y ropa protectora.



Mantenga una buena nutrición

Tenga siempre en cuenta las recomendaciones generales entregadas

SEÑALES DE ALERTA

PRECAUCIONES:

Contraindicado en embarazo y lactancia, alto riesgo para el bebé.

No se aplique ninguna vacuna sin la autorización de su médico.

No tome medicinas naturales y/o alternativas mientras este tomando este medicamento sin antes consulta a su médico o farmacéutico, El hipérico o "hierba de San Juan" puede reducir la eficacia de este fármaco.

Tanto para hombres como para mujeres: Evite la concepción mientras tome Vandetanib.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los que recibió con fórmula médica y los que compró en la farmacia, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta.

Vandetanib puede interactuar con varios medicamentos comunes. Asegúrese de informar a su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento nuevo.



Los síntomas que se indican a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. Comuníquese con su proveedor de atención médica en un plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes síntomas:

- Fiebre de (38 °C) o más, escalofríos.
- Ritmo cardíaco irregular, aturdimiento o sensación de que se va a desmayar.
- Dificultad para respirar o disnea.
- Cefaleas, convulsiones, confusión, alteraciones en la vista o problemas de razonamiento.
- Diarrea y/o vómitos (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).
- Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con los medicamentos recetados).
- Incapacidad de comer o beber durante 24 horas o signos de deshidratación: cansancio, sed, sequedad bucal, orina oscura y en menor cantidad o mareos.
- Color amarillento de la piel o los ojos.
- Orina de color oscuro o marrón (del color del té).
- Dolor en la parte derecha del estómago.
- Sufre hemorragias o hematomas con mayor facilidad que de costumbre
- Alteraciones de la piel (erupción, acné, prurito, ampollas, descamación, enrojecimiento o inflamación).
- Presión arterial elevada



ONCÓLOGOS DEL OCCIDENTE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON HUMANIDAD

VANDETANIB



**No deje que ninguna otra persona
tome sus medicamentos.**

Medicamento reempacado por CRM- Oncólogos del
Occidente S.A.S. Certificado en BPE, resolución
2015018305 de 11-05-2015

www.oncologosdeloccidente.com

Armenia
Sede ppal. Av. Centenario
Cra. 6 A N° 2-63
7383100
Hospital San Juan de Dios 4° piso

Pereira
Clínica de Alta Tecnología Maraya
Clí 50 N° 13-10
3310712 Ext 468
Av. Circunvalar N° 1-46

Manizales
Sede San Marcel
Calle 92 N° 29-75
Hospital Universitario Infantil
Calle 48 N° 25-71
8933440-8742494

Cartago
Cra 2 N° 23-12
2144646